

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

PARTIE I-Exercice 1


Sans calculatrice

Durée : 20 minutes

Automatismes (5 points)

	Énoncé	Réponse
1)	Donner l'écriture scientifique de $\frac{7315}{100}$.	
2)	<p>Dans un repère du plan ci-dessous on considère la courbe représentative d'une fonction f définie sur \mathbb{R}.</p> <p>Étudier le signe de la fonction f sur l'intervalle $[-1 ; 4]$.</p>	
3)	Quelle est la somme de $\frac{1}{7}$ et de $\frac{1}{14}$?	
4)	Donner le signe du nombre $\frac{-2}{5} \times \frac{4-6}{-3}$.	
5)	Compléter l'égalité :	$3,47 \times 10^3 \text{ cm} = \dots \text{ m}$
6)	Écrire le nombre 2^{-3} sous forme fractionnaire.	
7)	Compléter l'égalité :	$3 \times \dots = 7$
8)	Une cycliste parcourt 3 km en 10 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h pendant ce parcours ?	





9)	Dans une classe de trente élèves, un tiers sont des garçons. La moitié des garçons portent des lunettes. Quelle est la proportion de garçons portant des lunettes dans la classe ?													
10)	<p>On établit une série statistique dans le tableau d'effectifs ci-dessous :</p> <table border="1" data-bbox="368 667 922 779"><thead><tr><th>Partie</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Effectif</td><td>20</td><td>30</td><td>5</td><td>25</td><td>80</td></tr></tbody></table> <p>Dans un diagramme circulaire, la mesure en degrés de l'angle du secteur angulaire représentant la partie A est égale à ...</p>	Partie	A	B	C	D	Total	Effectif	20	30	5	25	80	
Partie	A	B	C	D	Total									
Effectif	20	30	5	25	80									



Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

Séries technologiques : classe de première

Épreuve commune de contrôle continu : Mathématiques

PARTIE II

Calculatrice autorisée selon la réglementation en vigueur


Cette partie est composée de trois exercices indépendants.


EXERCICE 2 (5 points)

On considère une fonction polynôme du second degré f définie sur \mathbb{R} .

Dans un repère du plan, la courbe représentative (P) de la fonction f passe par les points de coordonnées respectives $(2 ; 0)$ et $(6 ; 0)$. Ci-dessous, on visualise une partie de la courbe (P).

- 1) Quelle est la nature de la courbe (P) ?
- 2) Par lecture graphique, peut-on envisager que la fonction f admette un minimum sur \mathbb{R} ? Si oui, quelle semble être sa valeur et en quel réel semble-t-il être atteint ?
- 3) Déterminer les réels x_1 et x_2 tels que pour tout réel x , $f(x)$ est égal à $(x - x_1)(x - x_2)$.
- 4) Justifier par le calcul vos réponses à la question 2).
- 5) Le point A de coordonnées $(10 ; 31)$ appartient-il à la courbe (P) ?





EXERCICE 3 (5 points)

Une épidémie a frappé les habitants d'une ville. On s'intéresse à la progression de cette épidémie en fonction du temps.

On peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction g définie et dérivable sur $[0 ; 30]$ par


$$g(t) = -t^3 + 30t^2$$

où $g(t)$ le nombre de malades lié à l'épidémie au cours du temps t exprimé en heures.

On note g' la fonction dérivée de g sur $[0 ; 30]$.

- 1) Vérifier que pour tout réel t de $[0 ; 30]$, on a : $g'(t) = -3t(t - 20)$.
- 2) Étudier le signe de g' sur $[0 ; 30]$.
- 3) En déduire les variations de g sur $[0 ; 30]$.

La courbe ci-dessous représente la fonction g sur $[0 ; 30]$ dans un repère du plan.



4) Avec la précision permise par le graphique, déterminer le nombre de jours durant lesquels le nombre de malades est supérieur ou égal à 25 % du pic de l'épidémie.

5) Interpréter l'évolution des valeurs suivantes dans le contexte de l'expansion de l'épidémie

$$g'(12) = 288, g'(18) = 108 \text{ et } g'(20) = 0.$$



