






	Enoncé	Réponse
6.	<p>On a tracé dans le repère ci-dessous une droite D et C_f, la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-1;6]$. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique :</p> 	
7.	a. Donner le tableau de signes de la fonction f sur l'intervalle $[-1;6]$.	
8.	b. Déterminer $f(3)$.	$f(3) =$
9.	c. Résoudre $f(x) = 6$.	
10.	d. Résoudre $f(x) \geq 3$.	
	e. Donner une équation de la droite D .	



EXERCICE 3 (5 points)

La glycémie est la concentration massique exprimée en gramme par litre (g.L^{-1}) de sucre dans le sang. Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc une glycémie trop élevée.

Une glycémie est normale lorsqu'elle est comprise entre $0,7 \text{ g.L}^{-1}$ et $1,1 \text{ g.L}^{-1}$ à jeun et lorsqu'elle est inférieure à $1,4 \text{ g.L}^{-1}$, une heure et trente minutes après un repas.

Lorsque l'on suspecte un diabète, on pratique un test de tolérance au glucose.

Lorsqu'il est à jeun, le patient ingère 75 g de glucose au temps $t = 0$ (t est exprimé en heure).

Pour tout réel t de l'intervalle $[0;3]$, la glycémie du patient, exprimée en g.L^{-1} , t heures après l'ingestion, est modélisée par la fonction f définie sur $[0;3]$ par :

$$f(t) = 0,3t^3 - 1,8t^2 + 2,7t + 0,8.$$

1. Que valait la glycémie du patient à jeun ?
2. a. On note f' la fonction dérivée de la fonction f . Montrer que pour tout réel t appartenant à $[0;3]$,

$$f'(t) = 0,9(t - 1)(t - 3)$$

- b. Étudier le signe de $f'(t)$ sur $[0;3]$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0;3]$.
3. a. Au bout de combien d'heures la glycémie du patient est-elle maximale et que vaut-elle ?
b. Peut-on suspecter un diabète chez le patient ? Expliquer.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat : N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le : / /



1.1

EXERCICE 4 (5 points)

Dans une population, une personne sur 250 est porteuse d'un gène qui entraîne, à l'âge adulte, une maladie handicapante.

1. On choisit trois personnes au hasard dans cette population, qui est suffisamment grande pour que ce choix puisse être assimilé à trois tirages successifs avec remise.
 - a. Justifier qu'il s'agit de la répétition de trois épreuves aléatoires et indépendantes de Bernoulli dont on donnera le paramètre.
 - b. Construire un arbre pondéré représentant la situation.
 - c. En déduire la probabilité qu'au moins une personne parmi les trois soit porteuse du gène.

2. On teste des personnes au hasard dans cette population jusqu'à ce qu'on obtienne une personne porteuse du gène.
On veut modéliser cette expérience à l'aide d'une fonction qui retourne le nombre de personnes à tester avant d'en trouver une porteuse du gène.
 - a. Compléter sur l'**annexe**, à remettre avec la copie, le programme écrit en langage Python
 - b. Que permet de conclure l'affichage donné par l'instruction suivante écrite en langage Python ?

```
>>> malade()
575
```



