



Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

PARTIE I

Exercice 1 (5 points)

Automatismes (5 points)

Sans calculatrice

Durée : 20 minutes


L'exercice comporte 10 questions indépendantes. Seules les réponses sont attendues.

Questions	Réponses
1. Donner l'écriture décimale de $\frac{5}{4}$.	
2. Comparer $\frac{11}{100}$ et $\frac{3}{25}$.	
3. Augmenter de 15% revient à multiplier par :	
4. Une agence propose 20 % de réduction sur un voyage à 800 euros. Calculer le prix réduit de ce voyage.	
5. Résoudre dans \mathbf{R} l'équation : $x^2 = 5$	
6. Résoudre dans \mathbf{R} l'équation : $-x(-3x + 2) = 0$	
7. Développer et réduire l'expression : $(x + 1)^2 + x(x - 2)$	
8. Dresser ci-contre le tableau de signe de la fonction définie sur \mathbf{R} par : $f(x) = \frac{x}{2} - 4$.	



9. La courbe C a pour équation : $y = x^2 - x$.
Donner l'ordonnée du point d'abscisse (-2) de cette courbe.

10. \mathcal{C}_f est la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-7; 5]$.



Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation :

$$f(x) < 0$$

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat : N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le : / /

 Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

PARTIE II

Calculatrice autorisée.

Cette partie est composée de trois exercices indépendants.

Exercice 2 (5 points)

ABCDEFGH est un cube dont les faces EFGH et ABCD, BFGC et AEHD, DCGH et ABFE sont deux à deux opposées.

1. Compléter la figure donnée **en ANNEXE** en représentant en perspective cavalière le cube ABCDEFGH dont l'arête [AB] est tracée. La face ABCD sera placée dans un plan frontal. On prendra comme angle de fuite $\alpha = 60^\circ$ et comme rapport de réduction $k = 0,5$.
2. On se place dans le repère orthonormal de l'espace (A ; B ; E ; D).
 - a) Déterminer les coordonnées, dans ce repère, du point I milieu du segment [DC].
 - b) Déterminer les coordonnées, dans ce repère, du point J défini par $\vec{CJ} = 0,8 \vec{CG}$ et placer le point J sur la figure **en ANNEXE**.
 - c) Le triangle FIJ est-il rectangle ? Justifier.
3. Compléter la figure **en ANNEXE** en traçant la section du cube ABCDEFGH par le plan (AIJ).



Exercice 3 (5 points)

Une station de montagne décide d'aménager une falaise afin de créer un site d'escalade. La falaise a une hauteur de 10 mètres. L'aménagement doit se faire depuis le haut de la falaise.

Une entreprise propose le devis suivant :

- le premier mètre aménagé coûte 40 €,
- chaque mètre supplémentaire aménagé coûte 5% de plus que le mètre précédent.

On modélise le prix du n -ième mètre aménagé par le terme de rang n d'une suite (u_n) , on a donc : $u_1 = 40$.

Les résultats seront arrondis à l'euro.

1. a) Calculer le prix du deuxième mètre aménagé.
b) Calculer le prix pour aménager deux mètres de falaise.
2. Justifier que la suite (u_n) est géométrique de raison 1,05.
3. Est-il vrai que le pourcentage d'augmentation permettant de passer du prix demandé pour aménager un mètre de falaise au prix demandé pour aménager trois mètres de falaise est supérieur à 200 % ?
4. Calculer le prix demandé pour aménager toute la falaise.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat : N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le : / /



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

Exercice 4 (5 points)

Une urne contient trois boules blanches et une boule rouge.

On tire au hasard une boule, on note sa couleur et on la remet dans l'urne.

On recommence une deuxième fois, puis une troisième fois.

On considère que les trois tirages sont indépendants.

On étudie l'expérience aléatoire constituée par ces trois tirages au hasard successifs.

1. Représenter cette expérience aléatoire par un arbre de probabilités.

Chaque issue de l'expérience peut être notée au bout de la dernière branche sous la forme d'un triplet du type (B, B, R) par exemple, B désignant le tirage d'une boule blanche et R celui d'une boule rouge.

On appelle X la variable aléatoire qui associe à chaque issue de l'expérience le nombre de boules rouges tirées.

2. a) Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire X ?

b) Traduire par une phrase l'événement noté $\{X = 3\}$.

3. Donner la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau.

4. Calculer l'espérance de X puis interpréter le résultat.



