

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

PARTIE I

Exercice 1 (5 points)

Automatismes (5 points)


Sans calculatrice

Durée : 20 minutes

	Question	Réponse																
1.	Un short de sport coûte 25€. Il est soldé et son prix est réduit de 10%. Quel sera son nouveau prix ?																	
2.	Le prix d'un tee-shirt est passé de 48€ à 60€. Calculer le taux d'évolution en % de cette augmentation. ;																	
3.	Simplifier $\frac{4^{-2}}{4^{-5}}$, pour l'écrire sous la forme d'une puissance de 4.																	
4.	Recopier et compléter : $22\text{km} + 12\text{hm} = \dots \text{m}$																	
5.	Développer et réduire : $(3x - 1)(6 - 2 + x)$ où x désigne un nombre réel.																	
6.	Résoudre dans \mathbb{R} l'équation : $x^2 - 4 = 0$																	
7.	A l'aide du tableau de signes ci-dessous, résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation : $(x - 2)(x - 5) < 0$.																	
	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$x - 2$</td> <td></td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$x - 5$</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	2	5	$+\infty$	$x - 2$		-	0	+	$x - 5$		-	-	0	+	
x	$-\infty$	2	5	$+\infty$														
$x - 2$		-	0	+														
$x - 5$		-	-	0	+													



8.



On donne ci-dessus la courbe représentative C_f de la fonction f sur $[-6; 5]$.

Dresser le tableau de variations de la fonction f .

9.

En reprenant la courbe de la question 8,
déterminer graphiquement $f(-4)$.

10.

En reprenant la courbe de la question 8,
résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.



Exercice 3 (5 points)

f est la fonction définie sur l'intervalle $[1 ; 74]$ par :

$$f(x) = -2x^2 + 140x - 148 .$$

1. On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f .
Montrer que, pour tout $x \in [1 ; 74]$, $f'(x) = 4(x - 35)$.
2. Etudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[1 ; 74]$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur l'intervalle $[1 ; 74]$.
4. A l'aide du tableau de variations de la fonction f , déterminer le signe de $f(x)$ pour tout $x \in [1 ; 74]$.
5. Déterminer l'abscisse du point de la courbe représentative de la fonction f où la tangente a pour coefficient directeur 3.

Exercice 4 (5 points)

Une usine produit un certain type de pièces d'horlogerie. A l'issue du processus de fabrication, une pièce peut ne présenter aucun défaut, ou peut présenter un défaut de masse, ou un défaut d'aspect, ou les deux défauts (masse et aspect).

- 97% des pièces ont une masse correcte ;
- 90% des pièces n'ont pas de défaut d'aspect (indépendamment du fait que sa masse soit correcte ou non).

On considère les événements suivants :

A : « l'Aspect de la pièce est correct » et M : « la Masse de la pièce est correcte »

Les résultats de cet exercice seront arrondis au millième près.

1. Déterminer la probabilité qu'une pièce présente un défaut de masse.
2. Construire un arbre de probabilité représentant cette situation.
3. Décrire par une phrase l'événement $M \cap \bar{A}$.
4. Déterminer, par le calcul, $P(M \cap \bar{A})$.
5. Déterminer la probabilité qu'une pièce présente un seul défaut.