


Pour les questions **8**, **9** et **10**, on considère la courbe C ci-dessous qui représente une fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[-4 ; 2]$ . La droite tracée est la tangente à la courbe C au point A d'abscisse  $-1$ .



<b>8.</b>	Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$	
<b>9.</b>	Déterminer graphiquement le signe de la fonction $f$ sur l'intervalle $[-4 ; 2]$ .	
<b>10.</b>	Déterminer graphiquement le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point A d'abscisse $-1$ .	

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :  N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le :  /  /



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

## Partie II

Cette partie est composée de trois exercices indépendants.  
La calculatrice est autorisée selon la réglementation en vigueur.

### EXERCICE 2 (5 points)

En France, la durée hebdomadaire moyenne, en heures, d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans est donnée dans le tableau suivant :


Année	2014	2015	2016	2017	2018
Rang de l'année $x_i$	1	2	3	4	5
Durée moyenne hebdomadaire d'utilisation d'internet, en heures, $y_i$	12,2	13,3	14,1	15,11	15,8

Source STATISTA

### Partie A

Le nuage de points  $M_i(x_i; y_i)$  est donné en **Annexe à rendre avec la copie**.

- À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite qui réalise un ajustement affine de ce nuage de points par la méthode des moindres carrés. On arrondira les coefficients au millième.
- Dans cette question, on modélise l'évolution de la durée hebdomadaire moyenne, en heures, d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans, par la droite  $\mathcal{D}$  d'équation :  $y = 0,9x + 11,4$ .
  - Tracer la droite  $\mathcal{D}$  dans le repère donné en **Annexe à rendre avec la copie page 9**.
  - En supposant que ce modèle est valide au-delà de 2018, estimer la durée hebdomadaire moyenne d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans en 2021.



## Partie B

On suppose que la durée hebdomadaire moyenne d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans augmente de 2 % chaque année à partir de 2018.

Dans ce modèle, on note  $v_0$  la durée hebdomadaire moyenne, en heures, d'utilisation d'internet pour l'année 2018 et  $v_n$  la durée hebdomadaire moyenne, en heures, d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans pour l'année  $(2018 + n)$ , où  $n$  est un entier positif ou nul. Ainsi,  $v_0 = 15,8$ .

1. On utilise une feuille de calcul d'un tableur pour obtenir les valeurs successives de la suite  $(v_n)$ . Une partie de cette feuille de calcul est reproduite ci-dessous.

	A	B
1	$n$	$v_n$
2	0	15,8
3	1	16,116
4	2	
5	3	
6		
7		
8		
9		

Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B3 pour obtenir, après recopie vers le bas, les valeurs des termes de la suite  $(v_n)$  ?

2. Pour tout entier naturel  $n$ , exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .
3. Estimer selon ce modèle la durée hebdomadaire moyenne, en heures, d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans en 2023.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :  N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le :  /  /



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

### EXERCICE 3 (5 points)

80 % des employés d'une société sont des commerciaux. 70 % de ces commerciaux, possèdent une voiture de fonction.

10 % des employés de cette société qui ne sont pas des commerciaux possèdent une voiture de fonction.


On interroge au hasard un employé de la société.

On considère les événements suivants :


- $C$  : « L'employé interrogé est un commercial. »
- $V$  : « L'employé interrogé possède une voiture de fonction. »

On note  $\bar{C}$  et  $\bar{V}$  les événements contraires respectifs des événements  $C$  et  $V$ .

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilités ci-dessous :



- Définir par une phrase l'évènement  $\bar{C} \cap V$ .
  - Calculer la probabilité  $P(\bar{C} \cap V)$ .
- Montrer que la probabilité que l'employé interrogé ait une voiture de fonction est 0,58.
- Calculer la probabilité que l'employé interrogé ne soit pas un commercial sachant qu'il possède une voiture de fonction.  
*On arrondira le résultat au centième.*



#### EXERCICE 4 (5 points)

Une entreprise fabrique et commercialise un produit P. La production mensuelle varie entre 1 et 10 tonnes.

Pour l'entreprise, le coût mensuel de production de  $x$  tonnes, exprimé en milliers d'euros, est modélisé par la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[1 ; 10]$  par :

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 9x + 81.$$

Pour une production mensuelle de  $x$  tonnes de produit P, on note  $C(x)$  le coût mensuel moyen de production en euros d'une tonne de produit fabriqué.

Ainsi, la fonction  $C$  est définie sur l'intervalle  $[1 ; 10]$  par :

$$C(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{x^3 - 5x^2 + 9x + 81}{x}$$

1. Montrer que, pour tout  $x \in [1 ; 10]$ ,  $C(x) = x^2 - 5x + 9 + \frac{81}{x}$ .
2. On note  $C'$  la dérivée de la fonction  $C$ . Calculer  $C'(x)$ , pour tout  $x \in [1 ; 10]$ .
3. On admet que, pour tout  $x \in [1 ; 10]$ ,  $C'(x) = (2x - 9) \frac{(x+1)^2 + 8}{x^2}$ .
  - a. Justifier que  $C'(x)$  a le même signe que  $2x - 9$  pour tout  $x \in [1 ; 10]$ .
  - b. En déduire le tableau de variations de la fonction  $C$  sur l'intervalle  $[1 ; 10]$ .
4. Déterminer la production mensuelle de produit P correspondant à un coût mensuel moyen de production par tonne minimal.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

## ANNEXE à rendre avec la copie

### Exercice 2, partie A.

